




LEGENDA

DEPOSITI CONTINENTALI

ALLOVIONI ALLUVIALI

Depositi ciottolosi e sabbiosi attuali in corrispondenza degli alvei fluviali.

AREA DI FRANA
Depositi destrutturati prevalentemente argillosi-arenacei con evidenti segni di espandimento stagionali dei cumuli verso valle e/o regressione dei fenomeni erosivi nei settori di cernamento.

MATERIALI ALLUVIONALI
Ciottoli poligenici in strati e banchi in matrice sabbio limosa, sabbie e sabbie limose, limi e limi argillificati in strati e banchi in corrispondenza dei terrazzi fluviali.

MATERIALE ELUVIO-COLLUVIALE

 MATERIALI ELUVIO-COLLUVIALI
Depositi solitamente incoerenti, talora debolmente coesi, a tessitura prevalentemente sabbio-finosi, accumulatisi alla base dei versanti e nelle incisioni vallive per colluvionamento, talora con orizzonti pedogenizzati e spinti agglutificazione; materiali di frana alterni e ricelibrati in corrispondenza di frane quiescenti o inattive. Detriti torrenziali e colluviali (b3)

MATERIALI COLLATIVI E PROCLASTICI
 L'irno sabbia-argilloso di colore bruno-rossa con inclusi pomice e proclastici fini (margineggianti ed angustifiliche) con sporadici litici di natura calcarea o arenacea. A luoghi, si rilevano strati di pomice e proclastici da caduta. Si tratta di materiali proclastici riequilibrati e/o collativi da rilievi retrostanti e di materiali proclastici da caduta.

DETRITTO DI FALDA
Accumuli incoerenti costituiti da clasti carbonatici ecretoneitici, localmente fino a blocchi di qualche mc, in matrice limosa-sabbosa, talora humificata e raramente cementata. Interclastati ai materiali detritici si rinvengono incoeli di materiali piroclastici, pelosoli e terre rosse. Alla base delle formazioni si rinvengono breccie cementate.

DEPOSITI FLUVIALI E LACUSTRI

DEPOSITI VULCANICI LASTICI

IONIMARIT CAMPANA

Iconmarit, costituito alla base di pomici da collina grigio chiaro e da fango polviscoloso di colore grigio scuro, telato all'istesso, con l'assunzione collettiva, a diverso grado di saldatura e l'infusione, con contenuto variabile di pomici grigio scuro, lo spessore varia dai pochi metri a qualche decina di metri; l'età radiometrica è di circa 37000 anni. Prevalente: sup.

IGC

SUCCESSIONE PLIOCENICA

AS intercalazioni di sabbie mediamente cementate che diventano predominanti nel settore nord-est ed est dell'affioramento, caratteristica della successione è il rinvenimento di macrofossili quali: gasteropodi, lamellibranchi, echinidi ed ostradi.

Pliocene inf.

[illegible]

FR

FORMAZIONE DEL FLUYSCH ROSSO

Argille, argille marine e marine di colore rosso, verde e biancastre alterate a strati e banchi, anche in nucleioli spessori, composti da calcari trisistallini, calcinuti, brecciate gradate e calcareniti.

Cretaceo - Cretozoico

Cretácico - Cenozo

Faglia: i trattini indicano la parte ribassata

Faglia presunta: i trattini indicano la parte ribassata

6 Località fossilifera

Discussion

Scarpatà morfologica o antropica


.....
Limite comunale

Città di
MONTESARCHIO (BN)

PUC

PIANO URBANISTICO COMUNALE
 oggetto:
 D.L. 19 del 22/2/2004 n. 46 - Impugnazione di Atto n. 9 del 19/3/2017 - DGR n. 2 del 08/08/2017
 STUDIO GEO - SISMICO
 D.L. n. 19 del 22/2/2004 n. 46 - DGR n. 2 del 08/08/2017

— CARTA GEOLOGICA



	G2a	4
--	-----	---

STUDIO ADINCO/CAICO : di Ag. Albert Otero

Il gestapo
di **Adriano Lauro**
di **ling. Domenico Di**